

TAC DEL CUORE DA STRESS (PERFUSION)

Formulazione corretta dell'impegnativa SSN:

- 1. TAC DEL CUORE SENZA E CON CONTRASTO (cod. nom. Cp87.41.1) con l'indicazione del quesito diagnostico : Studio anatomia coronarica e perfusione miocardica.**
- 2. VISITA CARDIOLOGICA (cod. nom.89.01.3) +MONITORAGGIO ELETTROCARDIOGRAFICO (cod. nom.89.54)**

Norme di preparazione:

- ✓ Si richiede prelievo per dosaggio della creatinina da eseguirsi nei 30 gg. precedenti l'esame;
- ✓ Digiuno da almeno 6 ore prima dell'esecuzione dell'esame;
- ✓ Nelle 24-48 ore prima, non assumere caffè, the, coca cola, cioccolato, pompelmo, banane e astenersi dal fumare; previo consulto del medico curante, sospendere farmaci antianginosi (cerotto di nitroderivato, mono-isosorbite dinidrato), farmaci cronotropi negativi (betabloccanti, calcioantagonisti ad azione centrale, ivabradina) e l'aminofillina;
- ✓ Portare con sé i risultati del dosaggio della creatinina e tutta la documentazione clinica;
- ✓ In caso di soggetti con storia positiva per grave forma di allergia sistemica (che abbia determinato la necessità di assistenza sanitaria in urgenza) o nota allergia al mezzo di contrasto, eseguire, previo consenso da parte del medico curante, la seguente preparazione: Deltacortene 25 mg, 2 cp: 12 ore prima, 7 ore prima e 1 ora prima dell'esame e Cetirizina 10 mg (es. Zirtec) 1 cp 1 ora prima dell'esame.
- ✓ Leggere attentamente, compilare il consenso informato e il questionario allegati, portandolo con sé il giorno dell'esame. Qualora il paziente non sia in grado di rispondere a una o più domande, o abbia eventuali dubbi, si prega di lasciare tali caselle in bianco compilandole successivamente insieme al Medico esecutore che contestualmente valuterà l'idoneità all'esame.